

# 從齒健康

## 牙周病徵兆與預防



你的牙齒夠健康嗎？



牙周病是成年人常見的口腔疾病！



根據研究顯示，我國牙周病盛行率高達8成，其中有5成處於嚴重的狀態，而且牙周病會隨著年齡增長漸漸惡化。

## 牙周病發生的原因

最主要的致病因：細菌及牙菌斑

其他加重症狀之因素：

**抽菸** 抽菸使微血管收縮，錯失早期牙齦出血警訊；降低牙周病的治療成功率。

**基因** 有些人的基因比較容易患有牙周病，遭受細菌攻擊其免疫機制無法抵抗，使破壞加速。

**壓力** 壓力可能導致免疫力降低，無法抵抗牙周致病菌的侵犯。

**磨牙或緊咬習慣** 磨牙或過度重咬可能會讓牙齒受力過大，加上牙菌斑的堆積，可能會加速牙周組織的破壞。

**年紀** 研究發現80歲以上老年人全口無牙率12.7%，有牙周問題者高達88.7%。

## 牙周病的演變



**初期** 產生牙齦紅腫、刷牙流血的現象。

當牙齦炎發生且沒有治療時，將演變成爲牙周病。



牙周慢性發炎，會導致囊袋加深、齒槽骨喪失，最後發生牙齦萎縮，牙齒鬆動等症狀。

**小提醒**



牙齦炎是可逆的，可藉由治療及維持好的口腔衛生習慣，讓牙齦恢復健康。



## 牙周病症狀



牙周病是牙齒周圍組織(或稱牙周組織)的疾病，牙周組織包含牙肉、齒槽骨與牙周韌帶。牙周組織受到細菌的侵犯，會造成牙齦發炎(牙齦炎)，若沒有及早治療，會使得牙周組織被破壞，進而發生齒槽骨漸漸流失，並可能導致牙齒脫落的結果。

### ◆ 牙齦炎症狀 ◆

刷牙容易流血，牙齦紅腫，並可能出現口臭。

### ◆ 牙周病症狀 ◆

**早期** 牙齦退縮露出牙根，對冷熱有敏感現象。

**晚期** 牙齒鬆動、化膿、掉牙，咀嚼時容易疼痛或無力。

## 自我照護及清潔 牙刷篇



### 貝氏刷牙法

(Bass Technique of Toothbrushing)

<p>1</p> <p>刷牙的牙齒面共有外側、咬合側、內側，三面都要依序清潔。</p>	<p>2</p> <p>刷牙時，牙刷與牙齒要呈現45度角，兩顆一起刷。</p>	<p>3</p> <p>每兩顆牙齒來回刷十下，並且不要太過用力，以免傷到琺瑯質。</p>
---	---	--

口訣321 三面都要刷 兩顆一起刷 來回刷十下

### 電動牙刷



新時代產物，對於清潔牙齒表面有不錯的效果

- ☞ 手部協調性較差者
- ☞ 小孩、殘障或是住院者需由他人代為潔牙者
- ☞ 牙齒矯正患者

## 自我照護及清潔 牙線篇



每天至少使用一次牙線，遠離牙周病。

### ▼ 一起來看看牙線的正確使用方式 ▼

<p>1</p> <p>每次取出約35-45公分的牙線。</p>	<p>2</p> <p>將牙線兩端纏繞在雙手中指之上。</p>	<p>3</p> <p>用食指與拇指支撐牙線，將牙線滑入每一個牙縫中。</p>
<p>4</p> <p>牙線兩端繞過牙齒呈現C字形，在牙齒側面上刮除牙菌斑。</p>	<p>5</p> <p>一個牙縫左右各清一次，並清完一個牙縫後移動一小段牙線，讓清潔的牙線持續保持乾淨。</p>	

## 自我照護及清潔 牙間刷篇



牙周病的患者，或是隨著年齡而牙齦萎縮的患者可能有牙縫寬大的問題，此時牙間刷就是不可或缺的清潔利器。

### ▼ 牙間刷使用方式 ▼

<p>1</p> <p>牙間刷有尺寸之分，選擇適合自己牙縫大小的牙間刷，太粗會導致牙齦受傷，太細則會清潔力度不足。</p>	<p>2</p> <p>依序以垂直牙齒表面的方式放入牙縫，做內外來回的清潔。</p>
<p>3</p> <p>可以適時的彎曲刷毛角度來做徹底的清潔。</p>	<p>4</p> <p>輕輕刷，但要刷多次一點，每一個牙縫清潔完後稍作清洗再進行下一個牙縫。</p>



## 牙醫師小叮嚀



牙周病如同慢性病，可經由治療得到良好的控制。正確使用潔牙工具，並定期回診，由牙醫師檢查，需要時做支持性牙周治療，維持口腔健康！

- ☑ 三餐飯後使用含氟量超過1,000ppm之牙膏正確刷牙
- ☑ 平時利用牙線或牙間刷加強清潔
- ☑ 觀察牙齦顏色：是否為健康的粉紅色，還是發炎的深紅色或流血紅腫
- ☑ 維持均衡飲食，少吃甜食
- ☑ 避免抽菸及嚼食檳榔
- ☑ 定期口腔檢查  
全民健保給付12歲以上民衆，每6個月洗牙1次

**預防勝於治療** 良好的口腔衛生、保持正常作息、均衡飲食、避免抽菸及定期口腔檢查，就是遠離牙周病的最佳方式！



## 健保及相關醫療資源

### 一般民衆



- ☑ 每半年提供定期牙結石/牙菌斑清除  
一般輕度牙周炎/牙齦炎患者

### 特殊族群



- ☑ 每九十天提供1次牙結石清除

- 1 適用於「全民健康保險牙醫門診總額特殊醫療服務計畫」之適用對象、化療、放射線治療病人(重度以上者每六十天)
- 2 口乾症病人
- 3 懷孕婦女
- 4 糖尿病患者
- 5 高風險疾病患者:
  - (1) 腦血管疾病患者。
  - (2) 血液透析及腹膜透析患者。
  - (3) 使用雙磷酸鹽類或抗骨鬆單株抗體藥物患者。
  - (4) 惡性腫瘤患者。
  - (5) 不符合「全民健康保險牙醫門診總額特殊醫療服務計畫」之肢體障礙、慢性精神病患者或重要器官失去功能者。

### 牙周病患者治療



- ☑ 利用有參與全民健保的醫療院所所提供的牙周病統合治療，如定期牙結石清除、牙根整平。(不含再生手術式的牙周翻瓣手術)
- ☑ 病情穩定者，每90天可再做一次牙周病支持性治療。



使用菸品健康福利捐 廣告



使用菸品健康福利捐 廣告